

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE TRES NIVELES DE TOSTIÓN EN LA CALIDAD EN TAZA DE ALGUNAS VARIEDADES DE CAFÉ DE LA ESPECIE COFFEA ARABICA L

Evaluation of the effect of three levels of roasting quality on the cup in some coffee varieties of the specie COFFEA Arabica L

Méndez Parra, Rosa María; Carmona Tabares, Paulo César; Molina Díaz, Oscar Emilio

Rosa María Méndez Parra

rosamendez@uniquindio.edu.co

Universidad del Quindío, Colombia

Paulo César Carmona Tabares

rosamendez@uniquindio.edu.co

Universidad del Quindío, Colombia

Oscar Emilio Molina Díaz

rosamendez@uniquindio.edu.co

Universidad del Quindío, Colombia

Revista de Investigaciones Universidad del Quindío

Universidad del Quindío, Colombia

ISSN: 1794-631X

ISSN-e: 2500-5782

Periodicidad: Anual

vol. 31, núm. 1, 2019

riug@uniquindio.edu.co

Recepción: 28 Mayo 2019

Aprobación: 05 Agosto 2019

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/517/5172268005/>

DOI: <https://doi.org/10.33975/riug.vol31n1.277>

Resumen: El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, y Colombia tiene cualidades excepcionales para su cultivo, producción e industrialización. El objetivo de este trabajo fue evaluar mediante catación, la calidad en taza de cuatro variedades de café, de origen colombiano (exactamente del Departamento del Quindío), de la especie *Coffea arabica* L. Se realizó un estudio de tipo cualitativo- y descriptivo, apoyado en un diseño experimental de dos factores, para el cual se escogieron las variedades: Geisha, Bourbon rosado, Moka y Castillo, los tres primeros son cafés especiales y el último es una variedad de porte medio, cuya calidad en taza es comparable con las otras. Para la evaluación en taza, se realizaron tres niveles de tostión; se encontró que la variedad Geisha obtuvo la mayor puntuación en sus tres niveles de tostión, y entre éstos, el nivel de tostión bajo resaltó más sus cualidades. Finalmente, se concluye que la variedad del café es uno de los factores que influye en la calidad de taza.

Palabras clave: cafés diferenciados, catación, niveles de tostión.

Abstract: Coffee is one of the most consumed beverages in the world, and Colombia has exceptional qualities for its cultivation, production and industry. The objective was to evaluate using a tasting panel, the quality in a cup of four varieties of coffee, of colombian origin (exactly from the Department of Quindío), of the species *Coffea arabica* L. A quantitative - descriptive study was carried out, supported in an experimental design, the selected varieties: Geisha, pink Bourbon, Moka and Castillo were chosen, the first three are special coffees and the last is a seed, of superior quality, comparable to the others. For the cup evaluation, different levels of roasting were performed. It was found that for the Geisha variety obtained the highest score in its three levels of roasting, and among these, the level of low roasting highlighted its qualities. It's concluded that for the varieties used, the variety of coffee influences the cup quality.

Keywords: Tasting panel, differentiated coffees, roasting levels.

INTRODUCCIÓN

El trabajo realizado consistió en evaluar la calidad en taza de cuatro (4) variedades de café, de la especie *Coffea arabica* L. dos de porte alto (Geisha, y Bourbon Rosado) y dos de porte bajo (Moka y Castillo), los tres primeros son cafés especiales o diferenciados y el último es una variedad que, por su porte superior, calidad y manejo en el beneficio, es comparable con las otras.

En este trabajo se presentan los resultados de un diseño experimental (Montgomery, 2017), que se realizó bajo condiciones homogéneas (altitud, humedad, pH, merma durante el proceso de tuestión, entre otros); las cuatro variedades que se caracterizan por su calidad, se evaluaron, de acuerdo a tres niveles de tuestión, esto es, se determinó cuál nivel de tuestión realza las características en las cuatro variedades de café

El proceso de tostado es clave en la cadena productiva del café, toda vez que durante éste se desarrollan diversas reacciones químicas y físicas que alteran, recrean, modifican o realzan la calidad en taza (Puerta, 2011).

El café pertenece al género *coffea*, y a la familia de las rubiáceas (*Rubiaceae*). Este género tiene dos importantes especies: arábica y *canephora* (o robusta), las cuales poseen sus propias cualidades, cultivándose en climas y altitudes distintas, consumiéndose más, a nivel mundial, la especie *Coffea arábica* (Puerta, 2000).

La calidad en taza de la bebida del café está ligada a los procesos que hay antes de su preparación: Clima, suelo, manejo del cultivo, recolección, beneficio, trilla, tueste, molienda y preparación, son todos eslabones en la cadena productiva del café y cuyas particularidades merecen ser estudiadas y llevadas con altos niveles de calidad para garantizar una taza de propiedades organolépticas excelentes.

El cultivo comercial del café en Colombia es una actividad agrícola e industrial que ha tenido una importancia social y económica significativa. Actualmente nuestro país exige para la comercialización de café pergamino seco un contenido final de humedad entre el 10-12%, con el fin de impedir la proliferación de microorganismos y la actividad enzimática que pueden deteriorar el grano durante su almacenamiento.

Dentro de las etapas de la cadena productiva de la industria cafetera, la del tostado viene siendo estudiada desde hace ya varios años, para determinar cómo es la dinámica de la transferencia de calor desde el cilindro o tambor donde se tuesta, al interior del grano, toda vez que en la tuestación el sabor natural del grano puede ser recreado o modificado con el fin de buscar una excelente calidad en taza.

El café colombiano cuenta con ventajas competitivas en el mercado internacional y, de hecho, se les reconoce un sobreprecio debido a varios factores como su origen geográfico, las respectivas condiciones climáticas y de suelos de sus cultivos, su origen botánico, especie y variedades sembradas, la cultura cafetera del país y los procesos realizados hasta la obtención del producto para exportación y consumo (Puerta, 2013).

En síntesis, hablar de la calidad del café consiste en establecer un equilibrio en la diversidad de sus atributos y características. Un café de calidad se caracteriza por ser una bebida con una taza limpia, con acidez y cuerpo medio-alto, aroma pronunciado y completo.

En el mercado mundial se manejan dos grupos principales de cafés: la calidad común y la calidad de los cafés especiales, aproximadamente el 80% del café comercializado corresponde a cafés de calidad común (Van Hilten, 2011), (Ponte, 2002). Para la Asociación de Cafés Especiales, S.C.A. (por sus siglas en inglés), al igual que para la Federación Nacional de Cafeteros, los cafés especiales son aquellos que conservan una consistencia en sus características físicas, sensoriales, prácticas culturales en su beneficio y en sus procesos finales; todas ellas corresponden a cualidades que los diferencian de los cafés comunes y por las cuales los clientes están dispuestos a pagar un precio superior (Arcila et al, 2007).

En el proceso de tostado se somete el grano de café al calor, el grano varía su coloración de verde a amarillo, luego a marrón y finalmente a un color más oscuro. Durante este proceso, que puede durar hasta 15 minutos con máquinas tostadoras trabajando entre 100°C y 300°C aproximadamente, se presentan dos momentos de “explosiones”, los cuales se utilizan como indicadores del nivel de tuestión alcanzado. En el momento que la temperatura interior del grano alcanza aproximadamente los 180°C se liberan los aceites que realzan el sabor del café y además se liberan grasas, azúcares y proteínas (cambios químicos). También, a medida que se tuesta el café, el grano va ganando volumen y perdiendo humedad (cambios físicos). Como conclusión tenemos que la variación de la temperatura y el tiempo de tostado del grano generan cambios en el color y el sabor del mismo (Giner, 2008).

La temperatura es fundamental durante la tuestión del café en virtud a que ella es responsable de las modificaciones que se puedan producir en las propiedades propias del grano, por esta razón es posible perfilar mediante el proceso de tostado la calidad de la taza. En ese sentido varios autores manifiestan la importancia de este eslabón en la cadena productiva de la industria cafetera.

METODOLOGÍA

Se seleccionaron granos, de la parte productiva de la planta (normalmente parte media), maduros y sobre maduros nada más y del mayor tamaño en cada caso. Las muestras de café fueron beneficiadas de la siguiente manera: el despulpado fue manual, la fermentación con la cantidad mínima de agua utilizando el método Fermaestro (Peñuela A. et al, 2014), secado al sol y trillado a mano, características propias de café tipo semilla para siembra. Al café Moka no le fue removido su mucílago para el secado y de esta manera, producir un café tipo honey (acaramelado). No obstante, esta variedad no fue tenida en cuenta al momento de la evaluación de los resultados ya que fue descalificada, resultando así un proceso de valoración de resultados para los cafés restantes.

Se contaron con muestras de 500 gramos de las variedades Geisha, Bourbon rosado, Moka y Castillo, procedentes de fincas de los municipios de Circasia y Pijao, en el Departamento del Quindío, con altitudes que varían de 1500 m.s.n.m. a 1800 m.s.n.m. y temperaturas promedios que varían entre 18°C a 22°C; se realizó un diseño experimental de dos factores, factor 1: variedad (Geisha, Bourbon rosado, Moka y Castillo) y factor 2: proceso de tuestión (bajo, medio y alto); de los 500 g se seleccionaron tres muestras de 100 g cada una, las cuales fue sometida a un procesos de tuestión diferente: bajo, medio o alto, iniciando

los procesos a una temperatura de 150°C, 170°C y 190°C, respectivamente. En todos los casos, se concluyó el proceso buscando un nivel medio de tostación para catación de cafés especiales según escala (AGTRON de 45-55). Para la tostión se usó una tostadora marca Quantik TC 300 AR-Profile, (dos tambores) y la medición del pH de las variedades se hizo en el Laboratorio del Grupo de Investigación de Frutos Tropicales, de la Universidad del Quindío.

Se hizo un análisis sensorial de cada una de las muestras de 100 g. (3 repeticiones por cada proceso de tostado, y tres procesos de tostado por cada variedad, en total 36 tazas fueron valoradas) con el apoyo de un profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, (por falta de recurso profesional al momento de la catación no se pudo contar con más catadores), se realizó de forma que la calificación se dio sin conocer la variedad y nivel de tostión de donde provenían las tazas; se utilizó agua de excelente calidad en la proporción de 150 mL para 8 g de café tostado y molido, usando para la evaluación la hoja de catación propuesta por la S.C.A (el Contrato Q del Coffee Quality Institute, utiliza éste formato para todas sus evaluaciones), la catadora evaluó las propiedades organolépticas del café y calificaron de forma cualitativa y cuantitativa (en una escala de 6 a 10) los siguientes aspectos: fragancia/aroma, acidez, cuerpo, sabor, sabor residual, balance, puntaje total. Por otros métodos se evaluaron peso, densidad, humedad, ancho, largo y peso de los granos, merma después del proceso de tostión y pH de la bebida, para todas estas variables se hizo estadística descriptiva. La variable Puntaje total fue valorada con análisis estadístico mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis.

RESULTADOS

Los valores promedios de humedad, densidad y pH, son dadas en la Tabla 1, las medidas promedio de largo, ancho y peso son dadas en la Tabla 2 y la pérdida de peso en porcentaje, para cada una de las variedades tostadas es detallada en la Tabla 3; de la información contenida en ellas, se deriva que la variedad con mayor densidad de grano es el Bourbon rosado y los valores de humedad de todas las variedades, son altos comparados con el valor ideal del 12%.

Tabla 1 Medidas de humedad, densidad y pH según variedad.

Variedad	Humedad %	Densidad (g/ml)	pH
Geisha	15,2	677	5,11
Bourbon rosado	15,7	674	5,05
Castillo	14,9	714	5,06
Moka	9,4	657	5,12

Tabla 2: Medidas de los granos de café acorde a la variedad.

Variedad/medidas	Largo (mm)	Ancho (mm)	Peso (g)
Geisha	10,2	7,3	0,2
Bourbon rosado	10,6	6,8	0,2
Castillo	10,3	7,0	0,2
Moka	7,0	6,6	0,12

Tabla 3: Porcentaje de pérdida de peso según variedad y nivel de tostión.

Variedad/ niveles de tostión	Bajo (%)	Medio (%)	Alto (%)
Geisha	32,9	18,0	18,1
Bourbon rosado	19,2	33,2	19,8
Castillo	31,5	17,6	16,6
Moka	28,7	12,6	11,8

La Tabla 4 resume la información del análisis estadístico no paramétrico para la variable Puntaje total, el cual fue realizado mediante prueba de Kruskal-Wallis (Peña, 2010), y en el que se encontró que, para las muestras usadas, existe una diferencia significativa entre las medianas de la variable Puntaje total, de las variedades Geisha, Bourbon rosado y Castillo, asumiendo un $\alpha=0,1$.

Tabla 4. Prueba de Kruskal-Wallis para Puntuaje total

Variedad	Tamaño muestra	Rango promedio
Geisha	3	7,83333
Bourbon	3	3,0
Castillo	3	4,16667

Estadístico = 5,13165 Valor-P = 0,0768556

La Figura 1 corresponde al gráfico de cajas, en el cual se observa que el 50% del café tostado de la variedad Geisha, tiene puntaje total promedio, mayor que las demás variedades, para los tres niveles de tostión.




Figura 1: Gráfico de cajas para la variable Variedad vs Puntaje total.

La Figura 2 corresponde al gráfico de medias, en el cual se evidencia que la variedad Geisha tiene una calificación más alta en el promedio de los puntajes totales de los tres procesos de tosti3n, frente al Bourbon rosado y Castillo.




Figura 2: Gráfico de medias para la variable Puntaje total vs Variedad.

Todas las muestras presentan características de suavidad, como es de esperarse en un café colombiano, algunas sobresalen por su fragancia/aroma (Geisha y Bourbon rosado, ambos en nivel medio de tosti3n), otras por su dulzor (Castillo en su nivel de tosti3n alto).

Los resultados de la evaluación de cataci3n en general, destacan la variedad Geisha y entre todos los niveles, el nivel de tosti3n bajo resalt3 más las cualidades del mismo, lo cual reafirma lo que usualmente se sugiere para esta variedad en cuanto al nivel de tueste. La variedad Moka fue descalificada ya que present3 un olor a fenol en el aroma, el cual se confirm3 en la bebida (posiblemente por un exceso de tiempo de fermentaci3n) y las restantes variedades obtuvieron calificaciones y puestos como se detalla a continuaci3n en la Tabla 5.

Tabla 5: Calificación de las variedades según la catación.

Nivel de tuestión/puntaje de calidad según variedad	Geisha		Bourbon rosado		Castillo	
	Calificación	Puesto	Calificación	Puesto	Calificación	Puesto
Bajo	85	1	81,5	7	80,8	8
Medio	83,25	2	82,3	5	82,8	3
Alto	82,8	3	82	6	82,5	4

Detallando el tiempo del proceso de tuestión se tiene que lo rec

Detallando el tiempo del proceso de tuestión se tiene que lo recomendable es que el grado de humedad del grano sea del 12%; ahora, en relación a los tres niveles de tuestión para cada una de las cuatro variedades, se encuentra que las muestras de Moka y Bourbon rosado, el tiempo de tuestión en el nivel bajo es más prolongado que los niveles medio y alto (10:00 y 13:30 minutos, respectivamente), en tanto que para las variedades Geisha y Castillo el nivel que mayor tiempo emplea para tostar el café es el medio (10:30 y 11:00 minutos, respectivamente). En este sentido (Giner, 2012) afirma que el tiempo del tostado depende de varios factores, entre los más importantes están: hábito de consumo, tipo de tostadora, variedad de café y usos del producto resultante.

En lo relacionado con el proceso de tuestión en sus tres niveles y la pérdida de peso en porcentaje, se puede afirmar de las muestras tostadas lo siguiente: entre más aumenta el nivel de tuestión, es menor el porcentaje de pérdida de peso (excepto para la variedad Bourbon rosado en su nivel medio, que pierde el 33,2% y en su nivel bajo pierde un 19% de su peso), esto es, hay mayor pérdida de peso en el nivel de tuestión bajo para las cuatro variedades y de ellas, el café Geisha tiene el mayor porcentaje (32,9%), en tanto que para el nivel de tuestión alto, en las cuatro variedades, se presenta el menor porcentaje de pérdida de peso. El café Moka presenta el porcentaje más pequeño (11,8%). Ahora, descartando la variedad Moka por el defecto que presentó, resulta que el café Castillo es la variedad de menor porcentaje de pérdida en el nivel tuestión alto (16,6%).

Las notas encontradas en fragancia / aroma y sabores percibidos según las variedades son detallados en la Tabla 6.

Tabla 6: Aromas y sabores de las variedades según catación

Variedad y nivel de tuestión	Fragancia -Aroma	Sabor
Geisha - Bajo	limoncillo, vainilla	limoncillo, panela
Geisha - Mediano	floral, coctel de frutas, vainilla	limoncillo, caramelo
Geisha - Alto	floral, cítrico, frutoso	dulce
Castillo - Bajo	cereal, madera	
Castillo - Mediano	nuez, madera	dulce, madera
Castillo - Alto	nuez, almendra	panela, cereal
Bourbon - Bajo	chocolate, maní, nuez	chocolate
Bourbon -mediano	cítrica, vainilla	nuez, chocolate, afrutado
Bourbon - Alto	floral, cítrica, amareto	caramelo, almendra

Finalmente, se presenta una caracterización descriptiva de las propiedades organolépticas de cada una de las muestras que en cada una de las variedades obtuvieron la mayor puntuación. En las Figuras 3-5, se resume el resultado del proceso de catación, de las cuales se puede decir que la variedad Geisha en el nivel bajo de tosti3n result3 con una mayor acidez y mayor cuerpo que las otras dos variedades, en tanto que la valoraci3n de la variable fragancia-aroma, la variedad Castillo fue menos calificada que las otras dos. En general, la variedad Geisha obtiene mayor calificaci3n en cada una de las variables.




Figura 3. Caracterizaci3n de la variedad Geisha nivel bajo.




Figura 4. Caracterizaci3n de la variedad Castillo nivel alto.




Figura 5. Caracterizaci3n de la variedad Bourbon nivel medio.

DISCUSIÓN

Con este trabajo se corrobora la suavidad y dulzura de la especie *Coffea arabica* L. Se confirma además, que las indicaciones que se tienen para el nivel de tuestión apropiado de los cafés según las variedades utilizadas, el nivel de tuestión bajo para el Geisha es el adecuado para destacar la calidad de las propiedades organolépticas del mismo y que en la variedad Castillo y Bourbon rosado, el nivel de tuestión medio, es el más adecuado o aconsejado para resaltar las propiedades que dan lugar a una taza de calidad, lo cual se puede verificar en las mayores puntuaciones obtenidas (Tabla 5).

También se resaltan los sabores afrutados de las variedades Geisha y Bourbon rosado.

Con la prueba estadística de Kruskal-Wallis y el resultado del proceso de catación, se puede concluir para las tres muestras evaluadas, que la variedad del café, realmente influye en el puntaje total de la taza.

Este tipo de estudios es relevante por cuanto permite a los caficultores y demás personas que obtienen su sustento de este pilar de la economía regional y del país, conocer aspectos que mejoran la calidad del café que producen y/o procesan.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Vicerrectoría de Investigaciones de Universidad del Quindío, a la Licenciatura en Matemáticas, al programa de Física y la Maestría en Biomatemáticas, por el apoyo en el desarrollo y la divulgación de los resultados (Proyecto de investigación No. 781) y a María Paula Pinzón y Diana Milena Galvis, por las asesorías recibidas.

Referencias

- Giner, J. (2012). El Tueste de Café. *Fórum Café*, 6-15.
- Montgomery, D. (2017). *Design and Analysis of Experiments*. Jhon Wiley & Sons.
- P.J. Arcila, F. Moreno, L.F. Salazar, E. Hincapié. (2007). *Sistemas de producción de café en Colombia*. Centro de Investigaciones CENICAFE.
- Peña, D. (2002). *Regresión y diseño de experimentos*. Alianza.
- Peña, D. (2010). *Regresión y diseño de experimentos*. Alianza.
- Peñuela A. et al. (2014). *Método fermaestro: Para determinar la finalización de la fermentación del mucílago de café*. Centro Nacional de Investigaciones de Café CENICAFE.
- Ponte, S. (2002). *Estándares, comercio y equidad: Lecciones de la industria de los cafés especiales*. *Economía Mundial del Café*. Centro de investigaciones para el desarrollo de Copenhague, 131-163.
- Puerta, G. I. (2000). *Calidad en taza de algunas mezclas de variedades de café de la especie Coffea arabica L.* *Cenicafé*, 5-19.
- Puerta, G. I. (2011). *Composición química de una taza de café*. *Avances Técnicos Cenicafé*, 1-12.
- Puerta, G. I. (2013). *Especificaciones de origen y buena calidad del café de Colombia*. Centro de Investigaciones de Café CENICAFE.

- Puerta, G. I. (2013). Especificaciones de origen y buena calidad del café de Colombia. . Centro de investigación del café CENICAFE.
- Schwartzberg, H. (2002). Modeling Bean Heating During Batch Roasting of Coffee Beans. Boca Raton, EEUU: CRC Press.
- Van Hilten, H. J., Fisher, P. J., & Wheeler, M. A. (2011). The Coffee Exporter's Guide. Geneva, Switzerland: International Trade Centre UNCTAD/GATT.
- W.N. Hernández-Díaz, I.I. Ruiz-Lopez, M.A. Salgado-Cervantes, G.C. Rodríguez-Jimenes. (2008). Modeling heat and mass transfer during drying of green coffee beans using prolate spheroidal geometry. Journal of Food Engineering, 1-9.