

Micetismo: Reporte de dos casos fatales y revisión bibliográfica

Castillo Godoy, Norma; Durán López, César Augusto; Matamoros, Mireya

Norma Castillo Godoy
dileniagodoy@gmail.com

Hospital Escuela, Honduras

César Augusto Durán López

Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
Honduras

Mireya Matamoros

Dirección de Medicina Forense, Ministerio Público de
Honduras, Honduras

Revista de Ciencias Forenses de Honduras

Dirección de Medicina Forense de Honduras, Honduras

ISSN: 2412-8058

ISSN-e: 2413-1067

Periodicidad: Semestral

vol. Vol 5, núm. 2, 2019

revistacienciasforenseshnd@gmail.com

Recepción: 01 Marzo 2018

Aprobación: 03 Junio 2019

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/153/153880005/index.html>

DOI: <https://doi.org/10.5377/rcfh.v5i2.8918>

Autor de correspondencia: dileniagodoy@gmail.com



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

CITAR COMO: Castillo Godoy ND, Durán López CA, Matamoros M. Micetismo: Reporte de dos casos fatales y revisión bibliográfica. Rev. cienc. forenses Honduras. 2019; 5(2): 25-34.

Resumen: Justificación: El micetismo es la intoxicación producida por la ingestión de setas silvestres, que puede presentarse clínicamente con diferentes síndromes toxicológicos, dependiendo de la especie de hongo involucrada y sus toxinas. Su importancia médico legal radica en que la ingesta puede ocurrir de manera accidental, homicida o suicida. **Objetivo:** Revisar aspectos relevantes sobre el micetismo, para el reconocimiento de síndromes toxicológicos asociados a la ingesta de setas. **Metodología:** Se revisaron diferentes bases de datos utilizando las palabras clave: micetismo, Amanita phalloides, autopsia médico legal, abordaje diagnóstico. **Resultados:** A. phalloides, contiene amatoxinas causantes de insuficiencia hepática aguda y las falotoxinas responsables de manifestaciones gastrointestinales 10 horas después de la ingesta, característica del síndrome tóxico faloidiano. Los casos que se describen corresponden a dos femeninas de la misma familia, una mujer adulta 36 años embarazada y su hija de seis años, procedentes de una comunidad rural en la parte central de Honduras, que fallecieron después de la ingestión de setas silvestres y cuyas autopsias se realizaron en la Dirección de Medicina Forense de Tegucigalpa, para establecer la causa de muerte. En la historia médico legal se consignó que los hongos fueron cocinados por la madre y consumidos por ella y su hija. **Conclusión:** Es recomendable la capacitación continua de los médicos de emergencia en hospitales, para el reconocimiento de síndromes toxicológicos asociados a la ingesta de setas, con el propósito de tratar oportunamente estos pacientes y ofrecerles mejor oportunidad de sobrevivir.

Palabras clave: Micetismo, Amanita phalloides, Autopsia, Abordaje terapéutico, Reporte de caso, Revisión Bibliográfica.

Abstract: Justification: Mycetism is the poisoning caused by the ingestion of wild mushrooms, which can occur clinically with different toxicological syndromes, depending on the species of fungus involved and its toxins. Its medicolegal importance is that the intake can occur accidentally, homicidally or suicidally. **Objective:** To review relevant aspects of mycetism, for the recognition of toxicological syndromes associated with mushroom intake. **Methodology:** Different databases were reviewed using the keywords: mycetism, Amanita phalloides, medicolegal autopsy, diagnostic approach. **Results:** A. phalloides, contains amatoxins that cause acute liver failure and falotoxins which are responsible for gastrointestinal manifestations 10 hours after intake, characteristic of the phalloidin toxic syndrome. The

cases described correspond to two women from the same family, a 36-year-old pregnant woman and her 6-year-old daughter, from a rural community in the central part of Honduras, who died after ingestion of wild mushrooms and whose autopsies were performed at the Department of Medicina Forense of Tegucigalpa, to establish the cause and manner of death. In the medicolegal history, it was reported that the mushrooms were cooked by the mother and consumed by her and her daughter. Conclusion: Continuous training of emergency doctors in hospitals is recommended for the recognition of toxicological syndromes associated with mushroom intake, to treat these patients on time and offer them a better chance of survival.

Keywords: Mushroom poisoning, Amanita phalloides, Autopsy, Treatment, Case report, Bibliographic review.

INTRODUCCIÓN

El micetismo se refiere a la intoxicación causada por el consumo de setas (macromicetos) ^{1, 2}, común en varios países incluyendo Honduras, y según la Organización Mundial de la Salud se presenta con alta tasa de mortalidad dependiendo de la especie involucrada ^{3,4,5,6}.

En España, el Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses reportó que la incidencia anual es de 5 a 10 casos por millón de habitantes, de los cuales el 30% son por amatoxinas, con mortalidad aproximada del 7% entre pacientes tratados y 30% entre los no tratados ^{1,2,3}.

En Honduras, el micetismo se presenta de manera cíclica y circunscrita a zonas donde se consumen setas tradicionalmente durante la época lluviosa ^{3,4,5}.

La intoxicación por setas tiene importancia médico legal ya que la ingesta puede ocasionar la muerte de manera accidental, homicida o suicida, y en relación a la posible responsabilidad profesional, cuando el médico no considera u obvia su diagnóstico para el adecuado tratamiento del paciente.

El micetismo puede ocurrir accidentalmente en adultos por la confusión de setas tóxicas con comestibles debido a su similitud, como se muestra en la **Figura 1**. También puede ocurrir en jóvenes que tienen el hábito de ingerir setas alucinógenas en combinación con alcohol, marihuana u otras drogas de abuso y en niños que ingieren setas que crecen en el jardín o césped de guarderías.

NOTAS DE AUTOR

dileniagodoy@gmail.com



FIGURA 1

Morfología macroscópica de algunas setas

Figura 1. A: Amanita phalloides tiene un sombrero color verde, que puede volverse amarillento y después blanquecino, en la parte inferior de mismo se ven láminas blancas. El pie es blanco con manchas verdes diminutas. Su carne es blanca, tierna, inolora en ejemplares jóvenes y maloliente, agria y repugnante en especímenes viejos. B: Amanita junquillea var. amici, algunos micólogos desaconsejan su consumo por la posible confusión con A. phalloides. C: Amanita caesarea, hongo conocido como “choro” y considerada delicia culinaria en el Occidente de Honduras. Fotografías tomadas de: <http://www.fichasmicologicas.com/?micos=1&alf=A&art=24>⁶

Se conocen entre 50 a 100 tipos de setas venenosas para los humanos, principalmente del género amanita, siendo las especies importantes A. phalloides, A. virosa, y A. verna; responsables de la mayoría de intoxicaciones, reportándose a Amanita phalloides como la especie que causa elevada mortalidad².

El objetivo de este trabajo es revisar aspectos relevantes sobre el micetismo, para el reconocimiento de síndromes toxicológicos asociados a la ingesta de setas, con el propósito de tratar oportunamente estos pacientes y ofrecerles mejor oportunidad de sobrevivir.

Entre las toxinas que posee A. phalloides, están las amatoxinas que causan insuficiencia hepática y la falotoxina, responsable del inicio tardío (> 10horas) de vómitos y diarrea. Otras especies como Amanita smithiana contiene una nefrotoxina. La Amanita muscaria y Amanita pantherina contienen toxinas de isoxazol que principalmente causan alteraciones del estado mental. También se han descrito otros géneros de setas que no son amanitas pero contienen amatoxinas como Lepiota, Galerina y Conocybe.^{7,8,9,10,11}

METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda en pubmed, google académico, science direct, usando los términos: Micetismo, Amanita phalloides, Autopsia, Abordaje terapéutico.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS AMATOXINAS Y PROPIEDADES

Las amatoxinas se consideran las toxinas más importantes de las setas venenosas por estar involucradas en el 90% de las intoxicaciones letales. Las amatoxinas son liposolubles y termoestables, no se descomponen, ni desnaturalizan cuando se congelan, cuecen o procesan; pueden provocar la muerte de un adulto a dosis de 0,1 mg/kg de peso corporal. La ingestión de 20 a 25 g de A. phalloides implicaría la exposición a 5-8 mg de amatoxina, letal para un adulto de 70 kg. Los niños se consideran un grupo especialmente sensible a estas intoxicaciones, presentando la mortalidad más elevada^{8,12}.

Su absorción ocurre rápidamente en el intestino y son transportadas al hígado, en los hepatocitos inhiben la ARN polimerasa, alterando la transcripción de ARN mensajero necesario para la síntesis de proteínas, produciendo daño celular caracterizado morfológicamente por necrosis hepática centrolobular y clínicamente por la aparición insidiosa de insuficiencia hepática^{9,11}.

PROGRESIÓN CLÍNICA DEL MICETISMO

La progresión clínica de la intoxicación por setas puede ser dividida en cuatro fases¹³:

1. **Latencia (asintomática)**: Las toxinas como tal no tienen propiedades irritativas y por tanto no hay síntomas.

2. **Gastrointestinal**: Dura en promedio de una a 24 horas, hay náuseas, dolor abdominal, diarrea que puede llegar a ser sanguinolenta, deshidratación, oliguria y alteraciones electrolíticas.

3. **Remisión clínica (mejoría aparente o convaleciente)**: Ocurre entre 36 y 48 horas después de la ingesta, las pruebas de laboratorio suelen estar alteradas y puede presentarse ictericia.

4. **Falla hepática y/o falla renal**: Empiezan a elevarse las aminotransferasas, hay aumento de la LDH, aumento de la bilirrubina, alteración de la coagulación, hipoglucemia, encefalopatía hepática e insuficiencia renal.

Al final de estas cuatro etapas puede presentarse falla multiorgánica con coagulación intravascular diseminada, acidosis metabólica, infarto de miocardio, trombosis mesentérica, convulsiones y finalmente la muerte entre una y tres semanas después de la ingesta o la resolución favorable con rápida mejoría de la función hepática y renal^{13,15,16}.

TRATAMIENTO

Aunque algunos autores mencionan que no existe antídoto para la intoxicación por setas, en estudios de intoxicación experimental, algunos fármacos como las cefalosporinas y penicilinas, han demostrado tener una acción protectora por la saturación del sistema multiespecífico de transporte en la membrana del hepatocito, impidiendo la entrada de las amatoxinas³.

El tratamiento médico está orientado a tratar de eliminar las toxinas del tracto digestivo, control de líquidos y electrolitos, la administración de penicilina o ceftriaxona, atención de problemas específicos como convulsiones, falla hepática y el mantenimiento de la diuresis. Así entre las medidas para el manejo y tratamiento de la intoxicación por setas se puede enumerar⁷:

1. Control de la vía aérea y ventilación mecánica en casos necesarios.
2. Monitorización continua del balance hídrico, presión venosa central y parámetros analíticos como medición de electrolitos y pH.
3. Aporte nutricional.
4. Reposición de líquidos con solución salina y soluciones glucosadas.
5. Evitar uso de benzodiazepinas.
6. Colocar sonda nasogástrica o nasoduodenal con carbón activado seriado, a razón de 1g/kg de peso la primera dosis, seguido de una dosis de algún catártico osmótico y después carbón activado a 0,5 g/kg de peso cada 4 horas por 72 horas.
7. En pacientes que hayan convulsionado o tengan riesgo de convulsionar, o estén en coma y previamente intubados, se recomienda un procedimiento controvertido para eliminar las amatoxinas que consiste en administrar carbón activado a través de sonda gastroduodenal, cerrar la sonda por dos horas y después aspirar continuamente el contenido digestivo por dos horas.
8. Penicilina G 300,000 UI/Kg/día (en infusión continua), con ajuste de dosis si hay insuficiencia renal.

9. Mantener diuresis forzada de 4-5 ml/kg/h usando algún diurético como furosemida o manitol para lograr la eliminación del 80% de la amanitina en las primeras 2 a 3 horas. Se añade furosemida con el objetivo de conseguir diuresis de 200 ml/hora en las primeras 24 a 48 horas.

10. Si hay insuficiencia hepática administrar N-acetil-cisteína en bolo de 150 mg/kg intravenoso, en 1 hora. Continuar con 50 mg/kg en 4 horas y 100 mg/kg en infusión continua durante 16 horas.

11. Vitamina K 10 mg/día, intravenosa.

12. Técnicas de depuración extracorpórea: Se han comunicado algunos casos con resultados favorables utilizando la hemodiálisis con cartuchos de carbón activado, la plasmaféresis y la diálisis de albúmina.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

A través del síndrome toxicológico observado en los pacientes, se puede determinar el tipo de setas involucrado, haciendo la asociación entre el periodo de latencia y los síntomas, como se ilustra en la **Figura 2**.




FIGURA 2.

Diagnóstico diferencial según la cronología y clínica de la intoxicación por setas

Benitez Macías J F, García Gil D, Brun Romero FM y Nogué Xarau N. Intoxicaciones agudas por setas. Rev Clin Esp. [Internet]. 2009 [citado 2017 Octubre 04];209(11):542-549. Disponible en:file:///C:/Users/user1/Downloads/S0014256509730619_S300_es%20(1).pdf

PRESENTACIÓN DE CASOS

Se describen dos casos de la misma familia, correspondientes a mujer adulta, de 36 años, embarazada y su hija de seis años, procedentes de una comunidad rural en la parte central de Honduras, sin antecedentes personales patológicos, que fallecieron después del consumo de setas silvestres y cuyas autopsias se realizaron en la Dirección de Medicina Forense de Tegucigalpa. La historia médico legal consignó que los hongos fueron cocinados por la madre y consumidos por ella y su hija.

El **Cuadro 1** detalla las características clínicas de ambos casos y la **Figura 3** esquematiza la línea temporal desde la ingesta de los hongos silvestres y el desarrollo de las etapas clínicas hasta la muerte. Debido a que durante la estancia hospitalaria no fue posible determinar la causa de muerte, las fallecidas fueron remitidas para autopsia médico legal; el **Cuadro 2** muestra el resumen de los hallazgos más relevantes de la autopsia.

CUADRO 1.
Presentación de las características clínicas de los casos.

	CASO 1 (Femenina de 36 años, madre)	CASO 2 (Femenina de 6 años, hija)
Fase de latencia	Tres (3) días	13 horas
Síntomas en la fase gastrointestinal	Dolor epigástrico intenso, vómitos, diarrea, puño percusión positiva.	Dolor epigástrico intenso, vómito, disenteria.
Centro Médico que atendió el inicio del cuadro clínico	Hospital Regional	Hospital Regional
Diagnósticos de Ingreso	1. Embarazo de 25 3/7 SG x FUM. 2. Síndrome gastroenterico de etiología bacteriana con deshidratación leve. 3. Pielonefritis.	No disponibles, no fue posible obtenerlos.
Tratamiento inicial	Antibioticoterapia (Ceftriaxona). Hidratación intravenosa.	Antibioticoterapia no especificada Hidratación intravenosa
Evolución clínica después de la fase gastrointestinal	Inestabilidad hemodinámica.	Mejoría al 4º día.
Síntomas y signos más severos (transición entre la fase gastrointestinal y falla multiorganica)	· Vómitos en pozo de café · Deshidratación · Alteración de la conciencia · Taquicardia · Disminución de pulsos periféricos · Cianosis y frialdad distal · Hematuria.	· Vómitos y diarrea de tres días de evolución · Hematemesis · Fiebre · Convulsiones · Hipoglucemia · Deterioro neurológico · Sangrado por sonda nasogástrica y tubo endotraqueal · Sangrado masivo nariz, recto y sitios de venopunción.
Diagnósticos de referencia a Hospital Nacional	Sangrado digestivo alto, falla hemodinámica, óbito fetal y falla multiorganica	Descartar neuroinfección, status convulsivo secundario a neuroinfección e hipoglucemia
Diagnóstico de ingreso a Hospital Nacional	1. Sangrado digestivo alto con inestabilidad hemodinámica de etiología a investigar. 2. Sospecha de intoxicación por hongos. 3. Embarazo de 27 5/7 por USG con sospecha de óbito fetal.	1. Falla ventilatoria secundaria. 2. Choque hipovolémico/séptico. 3. Coagulación intravascular diseminada por clínica. 4. Intoxicación alimentaria. 5. Síndrome convulsivo febril complejo.
Tratamiento en Hospital Nacional	Omeprazol, Ceftriaxona, Clindamicina.	Vitamina K, Ceftriaxone, Diazepam por convulsión, Fenutoina, Infusión Midazolam/Fentanilo, Infusión de dopamina.
Condiciones asociadas a la intoxicación.	· Trastorno hemorrágico: Sangrado Digestivo alto con inestabilidad hemodinámica. · Falla multiorganica.	· Hiperglucemia · Trastornos hidroelectrolíticos: Hipocalcemia e hipokalemia. · Trastorno hemorrágico: Sangrado orofaríngeo que procedía de vía digestiva, sangrado rectal y por sitios de venopunción. · Paro cardiorrespiratorio (se realizó reanimación cardiopulmonar).
Diagnósticos consignados antes de la muerte	1. Embarazo 28 SG x FUM con óbito fetal. 2. Sangrado digestivo alto de etiología a investigar. 3. Sospecha de intoxicación por hongos. 4. shock séptico foco de entrada gastrointestinal.	1. Síndrome posparada con sospecha de muerte cerebral. 2. Falla multiorganica. 3. Choque séptico/Hemorragico. 4. Síndrome Convulsivo Secundario. 5. Coagulación Intravascular Diseminada. Sangrado digestivo alto y epistaxis. 6. Necrosis hepática. 7. Falla renal aguda. 8. Sospecha intoxicación por amanita.
Inicio de tratamiento por sospecha de Intoxicación por setas	Ninguno.	cuarto día posterior a la ingesta, Piperacilina/tazobactam, Omeprazol, Sucralfato, N-acetilcisteina e hidrocortisona
Exámenes de laboratorio	Hemoglobina 11.2 g/dl Plaquetas 59 x10 ³ c/mm ³ , BUN 8 mg/dl, Creatinina 1.53 mg/dl, Albumina: 2.7 g/dl, Bilirrubina total: 6.8 mg/dl, Bilirrubina directa: 5.0 mg/dl, Sodio: 148 mg/dl	Tiempos de protrombina mayor de 90 seg, tiempo control de 12.3 seg Hemoglobina 4.2 g/dl Plaquetas 158,000 x 10 ³ , c/mm ³ , BUN 6 mg/dl, creatinina 1.3 mg/dl, AST: 4155 U/L, LDH: 1998 U/L, albumina 1.5 g/dl, Bilirrubina total: 2.8 mg/dl
Tiempo transcurrido desde la ingesta de setas hasta el fallecimiento.	6 días.	6 días.

Elaborada por autores

Debido a que durante la estancia hospitalaria no fue posible determinar la causa de muerte, las fallecidas fueron remitidas para autopsia médico legal; el Cuadro 2 muestra el resumen de los hallazgos más relevantes de la autopsia.

CUADRO 2.
Hallazgos en la autopsia médico legal

HALLAZGOS	CASO N° 1 (MADRE)	CASO N° 2 (HIJA)
Examen externo del cadáver	- Ictericia generalizada. - Cianosis en labios y uñas.	
Examen interno del cadáver	- Derrame pleural bilateral. - Ascitis. - Congestión visceral generalizada. - Estómago conteniendo líquido color en poso de café y congestión de mucosa estomacal e intestinal.	-Edema cerebral-Edema laríngeo -Mucosa traqueal congestiva
Reporte de Histopatología forense	- Hígado con necrosis hemorrágica multifocal. - Encefalopatía hipóxica. - Necrosis tubular aguda. -Congestión visceral generalizada. - Hemorragia reciente difusa en submucosa de estómago y colon.	- Necrosis isquémica difusa en la mucosa colónica. - Esteatosis hepática severa.
Laboratorio toxicológico de muestras postmortem	No disponible.	- Positivo para presencia de benzodiazepinas en orina. - Inhibición de colinesterasa en sangre a 44pH/Hora (valores normales entre 91-140 pH/Hora)
Causa de muerte	Insuficiencia hepática fulminante secundaria a intoxicación alimentaria por setas.	
Manera de muerte	Accidental.	Accidental.

Elaborado por autores




FIGURA 3

Línea temporal desde la ingesta de los hongos silvestres y el desarrollo de las etapas clínicas hasta la muerte

DISCUSIÓN

La ingesta de hongos silvestres es tradicional en la región occidental de Honduras¹⁷. Para el consumo humano se requiere la habilidad de reconocer las especies tóxicas. Los casos descritos proceden de la parte central del

país, región donde no es habitual comer setas, sin embargo, de acuerdo a información no corroborada la madre fallecida era de La Esperanza (Occidente de Honduras), lugar donde el consumo de setas es tradicional¹⁷.

Las intoxicaciones por setas se pueden clasificar según la duración de la etapa asintomática en:

1.-Intoxicaciones con período de latencia breve (el aparecimiento de los síntomas se considera temprano), inferior a seis horas, variando entre 30 minutos y tres o cuatro horas, por lo general son intoxicaciones leves.

2.- Intoxicaciones con periodo de latencia largo (el aparecimiento de los síntomas se considera tardío), superior a seis horas, variando entre nueve y quince horas, ocasionalmente llegando hasta los diez o quince días, en su mayoría son intoxicaciones graves^{1,3,14}. Los dos casos mostrados presentaron período de latencia largo, y mostraron los síntomas característicos de la fase intestinal: náusea, vómito y diarrea, característicos del síndrome faloidiano producido por la falotoxinas^{3,7,9,14,18}.

En los presentes casos, después de la sintomatología intestinal la menor mostró la fase de mejoría, la madre no, en su lugar ella tuvo deterioro progresivo hasta la falla multiorgánica, Generalmente, después que los síntomas gastrointestinales mejoran, el hígado se deteriora rápidamente, con incremento de las transaminasas y caída de los factores de coagulación^{3,7,14}.

Para el quinto día ambas tenían falla multiorgánica, cuya aparición varía entre tres y seis días, caracterizada por falla hepática fulminante, encefalopatía hepática, insuficiencia renal aguda prerrenal y edema cerebral, generalmente este último es la causa directa de muerte en el 80% de los casos^{3,7,14}; sin embargo, en estos casos no se evidenció herniación cerebral en la autopsia.

CONCLUSIONES

En estos casos no fue posible detectar la toxina debido a la falta de sospecha clínica temprana, sumado a que en el nivel regional de atención no se dispone de este tipo de análisis de laboratorio, sin embargo, pese que no se demostró la toxina en fluidos biológicos, ni en los alimentos porque no se recibieron muestras de las setas consumidas; basándose en los hallazgos de autopsia y en la información clínica como: el periodo de latencia largo, síntomas gastrointestinales, el desenlace fatal y el hallazgo en la histopatología de necrosis hepática multifocal^{19,20}, se consideró que la causa básica de muerte fue intoxicación por ingestión de setas tóxicas, posiblemente atribuidas al género amanita y la causa directa insuficiencia hepática con trastorno hemorrágico.

La manera de muerte se estableció como accidental, ya que se consignó en la historia médico legal la ingesta de las setas cocinadas por la madre y no se obtuvieron datos de la investigación policial, que evidenciaran una hipótesis alternativa.

En relación al tratamiento empleado, debido a que no se sospechó tempranamente la intoxicación por setas, las medidas fueron únicamente de sostén. Hasta el cuarto día, en la fase de falla hepática, se sospechó que la menor podía estar presentando un cuadro clínico de intoxicación por amanitas, decidiéndose la administración de piperacilina/tazobactam, N Acetil-cisteína y Vitamina K.

No se tomaron medidas para reducir la reabsorción del tóxico en el tracto digestivo, pudiéndose haber intentado ciclos de eliminación de toxinas mediante la colocación de sonda nasoduodenal y administración de Carbón activado, seguido de algún catártico osmótico. Tampoco se administró Penicilina G para bloquear la captación de amatoxina por los hepatocitos.

ASPECTOS MEDICO LEGALES

En la evaluación médico forense del micetismo es importante la recolección minuciosa de indicios físicos, químicos y biológicos, su protección en cadena de custodia tiene como objetivo obtener toda la información

necesaria para el sustento científico que permita vincular la historia clínica y los hallazgos de autopsia al tóxico, posibilitando determinar la causa de la muerte.

RECOMENDACIONES

Por el alto riesgo para la vida que implica la recolección empírica y la ingesta accidental de hongos, se podrían realizar campañas de educación continua en la población donde el consumo de setas es tradicional, para que esta práctica sea más segura y se preserve para fines turísticos.

Se sugiere capacitar continua y sistemáticamente a los médicos de emergencia en hospitales regionales y nacionales en los departamentos del centro y occidente de Honduras, para el reconocimiento de síndromes toxicológicos asociados a la ingesta de setas, con el propósito de tratar oportunamente estos pacientes y ofrecerles mejor oportunidad de sobrevivir.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Salud Madrid. Subdirección de Gestión y Seguimiento de Objetivos en Hospitales. Guía de actuación ante sospecha de intoxicación por setas – micetismos. [Internet]. [citado 2016 Octubre 04]. Disponible en: <http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017323.pdf>
2. Graeme, Kimberlie A. Mycetism: A Review of the Recent Literature J Med Toxicol. [Revista en internet] 2014 Jun; [citado 2017 nov 06].10(2): 173–189. Disponible en: <http://www.reviberoammicol.com/1999-16/121125.pdf>
3. Piqueras-Carrasco J. Intoxicaciones por setas, una actualización. Rev Esp Med Legal. [Internet] 2014[citado 2016 Julio 07];40(1):19 – 29. Disponible en: http://ac.els-cdn.com/S0377473213000369/1-s2.0-S0377473213000369-main.pdf?_tid=a521da5e-9091-11e6-8d300000aab0f01&acdnat=1476286769_f6170959a8150d9a3b310c0cf48c8047
4. Sarmiento E, Fontecha G. Conocimiento tradicional de los hongos en el occidente de Honduras. Cienc Tecnol [Internet]. 2013 [consultado 12 octubre 2016];13. Disponible en: <https://www.camjol.info/index.php/RCT/article/view/1710>
5. Organización Mundial de la Salud. Unintentional poisoning: burden of disease Data by country [Internet]. Ginebra: OMS; 2016 [consultado 6 de noviembre 2017]. Disponible en: <http://apps.who.int/gho/data/node.main.SDGPOISON393>
- 6.-Asociación cultural Baxauri (ES). Fichas micológicas: Amanita junquillea [Internet]. País Vasco: Cofradía Vasca de gastronomía; 2017. [consultado noviembre 2018]. Disponible en <http://www.fichasmicologicas.com/?micos=1&alf=A&art=24>
7. Cevik AA, Unluoglu I. Factors affecting mortality and complications in mushroom poisonings over a 20 year period: a report from Central Anatolia. Turk J Emerg Med [Internet]. 2016 [consultado 4 octubre 2017];14(3):104-10. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27331181>
8. Pérez Gordillo JH, Colbert Rodríguez M, Cruz Rivera N, Pérez Gordillo G. Falla hepática fulminante por intoxicación por Amanita Verna. Reporte de tres casos. Rev Hosp Jua Mex [Internet]. 2009 [consultado 2 octubre 2016];76(3):168-175. Disponible en:www.medigraphic.com/pdfs/juarez/ju-2009/ju093k.pdf
9. García J, Costa VM, Carvalho A, Baptista P, de Pinho PG, de Lourdes Bastos M, et al. Amanita phalloides poisoning: mechanisms of toxicity and treatment. Food Chem Toxicol [Internet]. 2015 [consultado 7 noviembre 2017];8:41-55. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691515300594?via%3Dihub>
10. Díaz JH. Amatoxin-Containing mushroom poisonings: species, toxidromes, treatments, and outcomes. Wilderness Environ Med [Internet]. 2018 [consultado 4 abril 2018];29(1):111-118. Disponible en: <http://bit.ly/344yrvf>

11. Horowitz BZ, Gossman WG. Toxicity, Mushrooms, Amatoxin. [2017]. en: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2018 Jan-. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431052/>
12. Yilmaz I, Akata I, Ermis F, Kaya E. A Case study: what doses of amanita phalloides and amatoxins are lethal to humans?. Wilderness Environ Med [Internet]. 2015 [consultado 4 abril 2018]; 26(4):491-6. Disponible en: <http://bit.ly/2XzScZd>
13. Barquero M, Bolaños P. Falla hepática aguda y otros trastornos causados por el consumo de Amanita phalloides. Med Leg Costa Rica [Internet]. 2016 [consultado 11 octubre 2017];33(1):96-102. Disponible en: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152016000100096
14. Benítez-Macías JF, García-Gil D, Brun-Romero FM, Nogué-Xarau S. Intoxicaciones agudas por setas. Rev Clin Esp [Internet]. 2009 [consultado 4 octubre 2017];209(11):542-549. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014256509730619>
15. Secretaría de Salud (MX). Centro de Información Toxicológica de Veracruz. Guía de diagnóstico y tratamiento de intoxicación por setas [Internet]. Veracruz: Secretaría de Salud; s.f.[consultado 5 abril 2018]. Disponible en: <https://www.ssaver.gob.mx/citver/files/2018/03/Micetismo.pdf>
16. Ventura S, Ruiz C, Durán E, Mosquera M, Bandrés F, Campos F, et al. Amanitinas. Rev Lab Clín [Internet]. 2015 [consultado 10 mayo 2018];8(3):109-126. <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-del-laboratorio-clinico-282-estadisticas-S1888400815000379>
17. Honduras Is Great. Así de lindo se celebró el festival del choro en la Esperanza. [Internet]. Honduras: HIG; 2019. [consultado 10 mayo 2018]. Disponible en: <https://hondurasisgreat.org/lafestival-choro-2018/>
18. Rodríguez-Maldonado M, López-Álvarez F, Andrade Padilla M. Intoxicación por hongos: A propósito de un niño con falla hepática. Rev Mex Pediatr [Internet] 2008 [citado 2017 Octubre 04]; 75(4): 171-174. Disponible en: <http://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2008/sp084g.pdf>
19. Sánchez-Guzmán S. Falla hepática fulminante secundaria a intoxicación por hongos (setas) reporte de caso y revisión. Rev Med MD 2016; 7.8 (1) Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revmed/md-2016/md161e.pdf>
20. Talamoni M, Cabrerizo S, Cari C, Díaz M, Ortiz de Rosas M, Sager I. Intoxicación por Amanita phalloides, diagnóstico y tratamiento. Arch Argent Pediatr [Internet]. 2006 [consultado 5 abril 2018];104(4):372-4. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752006000400018&lng=es

ENLACE ALTERNATIVO

<http://www.bvs.hn/RCFH/pdf/2019/pdf/RCFH5-2-2019-5.pdf> (pdf)

<https://www.lamjol.info/index.php/RCFH/article/view/8918> (pdf)